

Шкала оценки симптомов СДВГ у взрослых (ВОЗ, 2017)

Фамилия, Имя		Дата заполнения				
		Никогда	Редко	Иногда	Часто	Очень часто
Пожалуйста, ответьте на вопросы. Оцените себя по каждому из критериев, описанных ниже. При ответе на каждый вопрос, поставьте крестик в поле, которое лучше всего описывает ваше самочувствие и поведение в течение последних 6 месяцев						
1.	Как часто вам трудно сосредоточиться на том, что вам говорят люди, даже если они говорят непосредственно с вами?					
2.	Как часто вы встаете с места на встречах или в других ситуациях, когда вам требуется оставаться на месте?					
3.	Как часто вам бывает трудно отпустить всё и расслабиться, когда у вас есть время для себя?					
4.	Во время общения как часто вы замечаете, что заканчиваете предложения за своих собеседников, прежде чем они договорят?					
5.	Как часто вы откладываете все до последней минуты?					
6.	Насколько часто вы зависите от других людей в том, чтобы поддерживать свою жизнь в порядке и уделять внимание деталям?					

ADHD-ASRS v1.1

Шкала оценки симптомов СДВГ у взрослых (ASRS v1. 1) и система подсчета баллов были разработаны совместно с Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) и рабочей группой по СДВГ для взрослых, чтобы помочь медицинским работникам проводить скрининг своих пациентов на наличие СДВГ у взрослых. Подсчеты, полученные в результате этого скрининга, могут указать на необходимость более глубокого интервью с клиницистом. Вопросы в ASRS v1. 1 согласуются с критериями DSM-IV и касаются проявлений симптомов СДВГ у взрослых. Содержание опросника также отражает то значение, которое DSM-IV придает симптомам, нарушениям и анамнезу для постановки правильного диагноза. Для получения дополнительной информации о ADHD-ASRS v1. 1, пожалуйста, посетите: <http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/asrs.php>

Обновления шкалы на основе DSM-5

Вышеуказанные обновления были сделаны на основе Ustun et al. 2017 работа по разработке DSM-5 версии шкалы скрининга ASRS: Ustun, B., Adler, L.A., Rudin, C., Faraone, S.V., Spencer, T.J., Berglund, P., Gruber, M.J., Kessler, R.C. (2017). The World Health Organization Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Self-Report Screening Scale for DSM-5. JAMA Psychiatry, 74(5), 520-526. (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28384801>).

Есть два варианта подсчета баллов.

Во-первых, вы можете использовать простую оценку (т. е. оценивать каждый элемент в диапазоне 0-4 и давать каждому суммарный балл 0-24) и использовать полученный непрерывный балл 0-24 в качестве предиктора, не имея клинического порога. Любой может сделать это, не спрашивая разрешения. Это подход, который используется в подавляющем большинстве других шкал скрининга. Вы можете объединить это, если хотите, с полным списком симптомов ASRS v1. 1

(https://med.nyu.edu/psych/sites/default/files/psych/psych_adhd_checklist_0.pdf)

Во-вторых, вы можете связаться с Lenard Adler в Нью-Йоркском университете (Lenard.Adler@nyumc.org) чтобы получить разрешение на использование лицензированных правил подсчета очков для версии DSM-5. В таком случае вы получите веса, аналогичные приведенным в таблице выше, для новых элементов, и сможете использовать результаты для генерирования диагноза из суммарных оценок. Если предполагаемое использование предназначено для академических целей, а не является частью спонсируемого промышленностью испытания, плата за использование шкалы не взимается, но ваше учреждение должно будет подписать соглашение об использовании до того, как мы отправим инструкции по подсчету баллов. Это межведомственное соглашение является довольно стандартным. Запросы на коммерческое использование опросника требуют наличия лицензии, которую также можно оформить, связавшись с доктором Адлером.